



Empezando Empezando con XPOVIO® (selinexor)

el primer y único medicamento oral
en su tipo aprobado por la FDA

XPOVIO® (selinexor) es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos con ciertos tipos de linfoma difuso de células B grandes (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) que ha vuelto (recidivante) o que no responde al tratamiento previo (refractario) y que han recibido al menos 2 tratamientos previos.

XPOVIO está aprobado en función de la tasa de respuesta del paciente. Hay estudios en curso para confirmar el beneficio clínico de XPOVIO para este uso.

Se desconoce si XPOVIO es seguro y eficaz en menores de 18 años de edad.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO?

Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre antes de que comience a tomar XPOVIO y con frecuencia durante los primeros 3 meses de tratamiento y luego según sea necesario durante el tratamiento para monitorear los efectos secundarios.

Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de XPOVIO, interrumpir su tratamiento durante un período de tiempo o interrumpir completamente su tratamiento si usted tiene ciertos efectos secundarios durante el tratamiento con XPOVIO.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).





¿Qué es XPOVIO?

XPOVIO® (selinexor) es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos con ciertos tipos de linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) que ha vuelto (recidivante) o que no responde al tratamiento previo (refractario) y que han recibido al menos 2 tratamientos previos.

XPOVIO está aprobado en función de la tasa de respuesta del paciente. Hay estudios en curso para confirmar el beneficio clínico de XPOVIO para este uso.

Se desconoce si XPOVIO es seguro y eficaz en menores de 18 años de edad.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

XPOVIO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Bajos recuentos de plaquetas.** Los bajos recuentos de plaquetas son frecuentes con XPOVIO y pueden ocasionar sangrado, que puede ser grave y, a veces, puede provocar la muerte. Su proveedor de atención médica puede recetarle transfusiones de plaquetas u otros tratamientos para el bajo recuento de plaquetas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún sangrado o le aparecen fácilmente moretones durante el tratamiento con XPOVIO.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

**XPOVIO**[®]
(selinexor)

Índice

¿Qué es el linfoma difuso de células B grandes recidivante o refractario (DLBCL RR)?.....	4
¿Por qué XPOVIO® (selinexor)?.....	7
¿Qué es XPO1 y cómo actúa XPOVIO para bloquearla?.....	8
¿Cómo respondieron los pacientes al tratamiento con XPOVIO?.....	10
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XPOVIO?.....	12
¿Cómo tomo XPOVIO?	13
¿Qué más debo saber acerca de tomar XPOVIO?.....	14
Para los cuidadores: Cuidado de una persona que toma XPOVIO.....	16
¿Qué es KaryForward® y cómo me uno?	18
¿Qué tipo de apoyo y recursos adicionales están disponibles?.....	19

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).



¿Qué es el linfoma difuso de células B grandes recidivante o refractario (DLBCL RR)?



El linfoma difuso de células B grandes (DLBCL)

es un cáncer que comienza en las células B, un tipo de glóbulo blanco. Los glóbulos blancos forman parte del sistema inmunitario, que ayuda al organismo a luchar contra las infecciones y la enfermedad. El DLBCL puede extenderse a otras células, órganos y tejidos del organismo.

DLBCL RR es el cáncer que ha vuelto tras el tratamiento (recidivante) o ha dejado de responder a ciertos tratamientos (refractario).

El DLBCL RR es tratable.

Cuando el DLBCL es recidivante, su médico puede iniciar otro tipo de tratamiento para ayudarle a conseguir que su enfermedad esté controlada.

¿Cómo tratará mi proveedor de atención médica el DLBCL RR?



Existen diferentes opciones para el tratamiento del DLBCL RR, que incluyen:

Quimioterapia

Normalmente se reciben por vía oral, inyección o infusión con o sin otro tratamiento para destruir las células cancerosas

Trasplantes de células madre

Proporciona a los pacientes células madre sanas (las células formadoras de sangre del cuerpo) para sustituir las células dañadas

Terapia celular

Tratamiento en el que las células T, un tipo de célula del sistema inmunitario, se extraen de la sangre del paciente y se modifican en un laboratorio. Estas células modificadas pueden ahora ayudar a combatir las células cancerosas y se devuelven al cuerpo del paciente mediante infusión

Terapias más nuevas

Nuevos tipos de medicamentos que combaten el DLBCL RR de maneras diferentes

¿Cómo elegiremos mi proveedor de atención médica y yo un tratamiento?



Usted y su proveedor de atención médica decidirán juntos qué tratamientos son adecuados para usted

Algunos de los factores que puede considerar son:



Por cuánto tiempo se ha demostrado que el tratamiento funciona en pacientes con DLBCL RR



Otros problemas de salud que posiblemente tenga



Posibles **Efectos secundarios** del tratamiento



Tratamientos que ha recibido antes



Si puede acudir a una clínica para su tratamiento

¿Por qué XPOVIO® (selinexor)?


XPOVIO es el primer y único medicamento oral aprobado por la FDA de este tipo que puede tratar el DLBCL RR, incluso si otros tratamientos ya no funcionan para usted

XPOVIO es un comprimido que se toma por boca en el hogar

Usted **NO** tiene que ir al hospital para tomar XPOVIO
Usted **NO** tiene que tomar XPOVIO con cualquier otro medicamento contra el cáncer para DLBCL RR
XPOVIO es una terapia dirigida, **NO** una quimioterapia

Mata en el centro (núcleo) de las células

XPOVIO actúa en el centro de la célula (el núcleo) para matar algunas células cancerosas



Las respuestas fueron significativas

El 29 % de los pacientes mostró mejoría con XPOVIO

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN) recomienda selinexor (XPOVIO) para pacientes con DLBCL RR que han recibido al menos 2 líneas previas de terapia sistémica y cuya enfermedad ya no responde a ciertas opciones de tratamiento*

*Citado con permiso de la Guía de prácticas oncológicas de la NCCN (NCCN Guidelines®) para los linfomas de células B. V1.2023.
© 2023 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Todos los derechos reservados. Consultado el 9 de febrero de 2023. Para ver la versión más reciente y completa de la Guía de la NCCN, visite [NCCN.org](https://www.nccn.org) en línea. La NCCN no otorga ningún tipo de garantías con respecto a su contenido, uso o aplicación, y se exime de cualquier responsabilidad por su aplicación o uso de cualquier forma.


¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

- **Bajos recuentos de glóbulos blancos.** Los bajos recuentos de glóbulos blancos son frecuentes con XPOVIO y, a veces, pueden ser graves. Puede tener un mayor riesgo de contraer infecciones bacterianas durante el tratamiento con XPOVIO. Si es necesario, su proveedor de atención médica podría recetarle antibióticos si tiene signos o síntomas de infección, o ciertos medicamentos para ayudar a aumentar su recuento de glóbulos blancos.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

¿Qué es XPO1 y por qué es importante?




Para fines ilustrativos solamente.

XPO1 es una proteína que mantiene el equilibrio en las células sanas para que puedan funcionar correctamente


- Las células tienen importantes materiales anticancerosos que solo pueden funcionar en el centro de la célula (el núcleo)
- La XPO1 es una proteína que transporta estos materiales desde el núcleo hacia otra parte de la célula (el citoplasma)
- Para mantener la célula en equilibrio, la XPO1 solo transporta la cantidad adecuada de materiales anticancerosos fuera del núcleo

¿Cómo actúa XPOVIO® (selinexor) para bloquear la XPO1?

Algunas células cancerosas tienen demasiada XPO1



En esta célula cancerosa no hay exposición a XPOVIO




Célula cancerosa

La XPO1 mueve demasiados materiales anticancerosos desde el núcleo hacia el citoplasma, por lo que no pueden actuar para combatir el cáncer.

Crecimiento de las células cancerosas

Las células cancerosas pueden crecer y sobrevivir.

En esta célula cancerosa hay exposición a XPOVIO



XPOVIO bloquea la XPO1 para matar las células cancerosas en su núcleo

En esta célula cancerosa, XPOVIO impide que la XPO1 transporte demasiados materiales anticancerosos importantes fuera del núcleo

- Los materiales anticancerosos permanecen en el núcleo
- Mueren las células cancerosas

Para fines ilustrativos solamente.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

- **Náuseas y vómitos y/o diarrea.** Pueden producirse náuseas y vómitos y/o diarrea cuando toma XPOVIO y a veces pueden ser graves. Podría estar en riesgo de deshidratarse y de requerir tratamientos. Su proveedor de atención médica podría recetarle medicamentos contra las náuseas o la diarrea para que tome antes de que comience el tratamiento y durante el tratamiento con XPOVIO.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)



¿Cómo respondieron los pacientes al tratamiento con XPOVIO® (selinexor)?

En el ensayo clínico, 134 adultos con DLBCL RR fueron tratados con XPOVIO 60 mg los días 1 y 3 de cada semana. La aprobación de la FDA se basó en los resultados de este ensayo y podría ser necesario realizar ensayos adicionales.



El **29 %**
de pacientes
cuyos otros tratamientos
dejaron de funcionar
mostraron mejoría cuando
recibieron tratamiento
con XPOVIO

Se evaluó la respuesta a XPOVIO en pacientes independientemente del estado (n = 39):

- Su edad
- El número de tratamientos que han tomado antes
- El tipo de DLBCL que tienen
- Si el DLBCL ha dejado de responder a otros tratamientos
- Si se han sometido a un trasplante de células madre



Se ha demostrado que XPOVIO funciona cuando se toma por sí solo en pacientes con DLBCL RR. Los pacientes que respondieron no necesitaron tomar XPOVIO con otro medicamento contra el cáncer.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)


- **Pérdida de apetito y pérdida de peso.** La pérdida del apetito y la pérdida de peso son frecuentes con XPOVIO y, a veces, pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una disminución o pérdida del apetito y si está perdiendo peso. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos o aconsejarle sobre apoyo nutricional.
- **Disminución de los niveles de sodio en la sangre.** La disminución de los niveles de sodio en sangre es frecuente con XPOVIO y a veces también puede ser grave. Es posible que no tenga ningún síntoma. Su proveedor de atención médica puede hablar con usted acerca de su dieta y recetarle líquidos intravenosos o comprimidos de sal.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

¿Cuánto duraron las respuestas a XPOVIO® (selinexor)?

Los pacientes que respondieron a XPOVIO tuvieron una respuesta rápida y significativa



*La mediana de la duración de la respuesta (DR) fue un criterio de valoración secundario preespecificado, determinado por un análisis estadístico en particular. Las limitaciones para este análisis de los datos de este estudio incluyen un pequeño número de pacientes y el efecto de los datos de pacientes con duraciones prolongadas de remisión. Aproximadamente la mitad de los pacientes con respuesta en este análisis tuvieron una DR con una duración inferior a 3 meses.

El análisis de la DR se presenta junto con un análisis que demuestra el número de pacientes que responden en determinados puntos cronológicos (3, 6, 12 meses).

La **mediana** es el punto medio de un conjunto de números, en el que la mitad de los números están por encima de la mediana y la otra mitad está por debajo.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

- **Infecciones graves.** Las infecciones son frecuentes con XPOVIO, pueden ser graves y, a veces, pueden provocar la muerte. Esto incluye infecciones de las vías respiratorias altas o bajas, como la neumonía, y una infección de todo el cuerpo (septicemia). **Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún signo o síntoma de infección, como tos, escalofríos o fiebre, durante el tratamiento con XPOVIO.**

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XPOVIO® (selinexor)?

Efectos secundarios graves

- Bajos recuentos de plaquetas
- Bajos recuentos de glóbulos blancos
- Náuseas y vómitos
- Diarrea
- Pérdida de apetito y pérdida de peso
- Disminución de los niveles de sodio en la sangre
- Infecciones graves
- Efectos secundarios neurológicos

Efectos secundarios frecuentes

- Cansancio
- Bajo recuento de glóbulos rojos (anemia) Los síntomas pueden incluir cansancio y dificultad para respirar
- Estreñimiento
- Dificultad para respirar
- Aumento del azúcar en sangre
- Cambios en las sales corporales y los niveles de minerales en la sangre
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática y renal

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XPOVIO.

Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o en [fda.gov/medwatch](https://www.fda.gov/medwatch).



En el ensayo clínico, la cantidad de tiempo que los pacientes tomaron XPOVIO osciló entre 1 y 193 semanas, siendo la mediana de tiempo 9 semanas.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

- **Efectos secundarios neurológicos.** XPOVIO puede causar mareos, desmayos, disminución del estado de alerta y cambios en el estado mental, que incluyen confusión y disminución de la conciencia de las cosas que lo rodean. XPOVIO también puede causar problemas para pensar (problemas cognitivos), puede hacer que vea o escuche cosas que no existen realmente (alucinaciones) y puede hacer que se sienta muy somnoliento o adormecido. Estos problemas a veces pueden ser graves y potencialmente mortales. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).



¿Cómo debo tomar XPOVIO® (selinexor)?

La dosis recomendada de XPOVIO es de 60 mg tomada por vía oral los días 1 y 3 de cada semana



Cada comprimido de XPOVIO es de 20 mg

= 20 mg

- Los días 1 y 3 dependen del día de la semana en que comience a tomar XPOVIO. Por ejemplo, si comienza a tomar XPOVIO un martes, el martes es el día 1 y el jueves es el día 3
- No es necesario que tome XPOVIO con otro medicamento contra el cáncer para el DLBCL RR
- Tome el medicamento tal y como le haya recetado su proveedor de atención médica y asegúrese de decirle cómo se siente sobre la marcha
- No deje de tomar cualquier medicamento recetado por su proveedor de atención médica, antes y durante el tratamiento con XPOVIO, para ayudar a prevenir las náuseas y los vómitos. Informe a su proveedor de atención médica si el medicamento recetado no controla sus náuseas y vómitos



Durante el tratamiento, su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de XPOVIO. Siempre tome XPOVIO exactamente según lo prescrito.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

- **No conduzca ni maneje maquinaria pesada o peligrosa** hasta que sepa cómo le afecta XPOVIO. XPOVIO puede provocar mareos y confusión. Tome precauciones para evitar una caída.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

¿Qué más debo saber acerca de tomar XPOVIO® (selinexor)?



Hable con su proveedor de atención médica antes de cambiar la dosis o dejar de tomar XPOVIO



Trague XPOVIO entero, con agua. Nunca rompa, mastique, triture ni fraccione los comprimidos



Tome cualquier medicamento contra las náuseas/vómitos que le recete su proveedor de atención médica antes de que comience el tratamiento y durante el tratamiento con XPOVIO



Informe a su proveedor de atención médica si los medicamentos no lo ayudan con las náuseas/vómitos



Beba suficiente cantidad de líquidos durante el tratamiento para prevenir la deshidratación



Coma suficientes calorías para prevenir la pérdida de peso durante el tratamiento



Si omite una dosis de XPOVIO, tome la siguiente dosis en el siguiente día y horario regular programado



Si vomita después de tomar una dosis de XPOVIO, no tome una dosis adicional. Tome la siguiente dosis en el siguiente día y horario regular programado



Si toma XPOVIO de más, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato



No comparta su receta de XPOVIO con otras personas



Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre antes de que comience a tomar XPOVIO, con mayor frecuencia durante los primeros 3 meses de tratamiento y luego según sea necesario

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

Los efectos secundarios frecuentes de XPOVIO incluyen:

- Cansancio
- Bajo recuento de glóbulos rojos (anemia). Los síntomas pueden incluir cansancio y dificultad para respirar
- Estreñimiento
- Dificultad para respirar
- Aumento del azúcar en sangre
- Cambios en las sales corporales y los niveles de minerales en la sangre
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática y renal

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XPOVIO.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

¿Qué más debo preguntarle al equipo de atención médica antes de tomar XPOVIO® (selinexor)?



- 1 ¿Qué **medicamentos contra las náuseas** tomaré antes del tratamiento con XPOVIO?
- 2 ¿Con qué frecuencia tendré que hacerme un **análisis de sangre** mientras esté tomando XPOVIO?
- 3 ¿Cómo me aseguro de **mantenerme hidratado** mientras tomo XPOVIO?
- 4 ¿Es posible que **pierda peso** mientras tomo XPOVIO? ¿Cuánto?
- 5 ¿Cambiaré mi **dosis** a lo largo de todo el tratamiento con XPOVIO?
- 6 ¿Cómo se manejarán mis **efectos secundarios**?
- 7 ¿Qué debo hacer si tengo un **nuevo efecto secundario o síntoma**?
- 8 ¿Qué debo saber si estoy tomando **otros medicamentos**?



Hágale siempre a su proveedor de atención médica cualquier pregunta que tenga sobre el tratamiento con XPOVIO.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

Antes de tomar XPOVIO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, lo que incluye si le ocurre algo de lo siguiente:

- tiene o ha tenido una infección reciente o activa
- tiene o ha tenido problemas de sangrado
- está embarazada o planea quedar embarazada. XPOVIO puede dañar al bebé en gestación
- está tomando medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).


XPOVIO®
(selinexor)



PARA LOS CUIDADORES:

¿Cómo cuido de mí cuando estoy cuidando a alguien que toma XPOVIO® (selinexor)?

Cuidar de un ser querido con DLBCL RR puede ser emocional y físicamente exigente. Es importante **no perder de vista su propio bienestar**.

Un grupo de apoyo en línea o en su área local puede ayudarle a ponerse en contacto con personas que entienden lo que usted está pasando.

Los **proveedores de atención médica de su ser querido y el trabajador social** están ahí para responder sus preguntas y atender sus necesidades de apoyo.

Realizar actividades como el yoga y la meditación puede ayudar a aliviar el estrés.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

Capacidad para tener hijos: XPOVIO puede afectar a la capacidad de las mujeres y hombres para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Para las mujeres que pueden quedar embarazadas: su proveedor de atención médica comprobará si está embarazada antes de que comience a tomar XPOVIO. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XPOVIO y durante 1 semana después de su última dosis, pues XPOVIO puede causar daño a un bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o si cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con XPOVIO. No debe amamantar durante el tratamiento con XPOVIO ni durante 1 semana después de su última dosis de XPOVIO. Se desconoce si XPOVIO pasa a la leche materna.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

XPOVIO®
(selinexor)

PARA LOS CUIDADORES:

¿Qué debo saber acerca de cuidar a alguien que toma XPOVIO® (selinexor)?

Cuando cuide a un paciente que toma XPOVIO, tenga en cuenta lo siguiente:



El proveedor de atención médica determinará el **cronograma de administración de dosis** para XPOVIO y los medicamentos contra las náuseas



Llame al **proveedor de atención médica** si su ser querido experimenta algún efecto secundario



El equipo de atención médica le realizará **análisis de sangre** antes de que su ser querido comience a tomar XPOVIO, con mayor frecuencia, durante los primeros 3 meses de tratamiento y luego según sea necesario



Aliente a su ser querido a **beber mucho líquido y comer alimentos nutritivos** mientras toma XPOVIO



¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

Los hombres con parejas mujeres que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XPOVIO y durante 1 semana después de su última dosis.

Para informar las **SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS**, comuníquese con Karyopharm Therapeutics Inc., al 1-888-209-9326 o con la FDA, al 1-800-FDA-1088, o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

 **XPOVIO**[®]
(selinexor)

¿Qué es KaryForward y cómo me uno?

KaryForward es un programa de apoyo al paciente de Karyopharm Therapeutics dedicado a proporcionarle asistencia y recursos a usted y a su cuidador para el tratamiento con XPOVIO® (selinexor)

KaryForward puede ayudarlo con lo siguiente:



Cobertura del seguro*

- Conocer sus beneficios
- Presentar reclamaciones
- Proporcionar apoyo durante las apelaciones de seguros
- Descubrir lo que cubre su seguro
- Acceder a los medicamentos de Karyopharm, incluso si hay retrasos o interrupciones inesperadas



Asistencia financiera

- Reúna los requisitos para el programa de copagos de XPOVIO y pague apenas \$5 por cada receta de XPOVIO; o
- Si es elegible, obtenga XPOVIO sin costo alguno para usted



Apoyo y recursos

- Enfermeros administradores de casos, que pueden proporcionarle información y apoyo durante su tratamiento
- Derivaciones a apoyo adicional de terceros, como asistencia para el transporte

*Los especialistas en reembolso están disponibles para responder preguntas sobre el proceso de aprobación del seguro.

Consulte la **Información de seguridad importante** en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).



**SI ESTÁ PREPARADO PARA
INSCRIBIRSE O TIENE PREGUNTAS
SOBRE KARYFORWARD:**

LLÁMENOS AL

1-877-KARY4WD (1-877-527-9493)

De lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M.,
hora del este

VISÍTENOS EN

KaryForward.com



¿Qué apoyo adicional hay para mi cuidador y para mí?

Recursos del DLBCL

Leukemia & Lymphoma Society

www.lls.org

800-955-4572

Lymphoma Research Foundation

www.lymphoma.org

800-500-9976

Lymphoma Coalition

www.lymphomacoalition.org

Recursos de apoyo para el cuidador

Caregiver Action Network

www.caregiveraction.org

202-454-3970

Family Caregiver Alliance

www.caregiver.org

800-445-8106

Recursos generales para el cáncer

American Cancer Society

www.cancer.org

800-227-2345

CancerCare

www.cancercare.org

800-813-HOPE (4673)

Cancer Hope Network

www.cancerhopenetwork.org

877-HOPENET (467-3638)

Cancer Support Community

www.cancersupportcommunity.org

888-793-9355



Con el fin de mantener la independencia de estas organizaciones, Karyopharm no avala ni recomienda ninguno de los grupos de apoyo o servicios de esta lista y no es responsable del contenido de estos sitios o servicios. Hable siempre con su equipo de atención médica si tiene alguna pregunta.

XPOVIO® (selinexor) es el primer y único medicamento oral aprobado por la FDA de este tipo que puede tratar el DLBCL RR, incluso si otros tratamientos ya no funcionan para usted

- XPOVIO es **un comprimido que se toma por boca** en el hogar
- XPOVIO **actúa en el centro de la célula** (el núcleo) para matar algunas células cancerosas
- Los pacientes que respondieron al tratamiento con XPOVIO demostraron tener **una respuesta rápida y significativa**
- XPOVIO es una terapia dirigida, **no una quimioterapia**



**Obtenga más información
en XPOVIO.com**

**OBTENGA AYUDA Y RECURSOS PARA
EL TRATAMIENTO CON XPOVIO CON
EL PROGRAMA KARYFORWARD®.**

LLAME AL

1-877-KARY4WD (1-877-527-9493)

De lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M., hora del este

VISITE

KaryForward.com

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre XPOVIO? (continuación)

Los efectos secundarios más graves con XPOVIO incluyen recuentos bajos de plaquetas, recuentos bajos de glóbulos blancos, náuseas y vómitos, diarrea, pérdida del apetito y pérdida de peso, disminución de los niveles de sodio en sangre, infecciones y efectos secundarios neurológicos. Los efectos secundarios frecuentes incluyen cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), estreñimiento, dificultad para respirar, aumento del azúcar en sangre, cambios en la cantidad de sal corporal y minerales en la sangre y cambios en los análisis de sangre de la función renal y hepática.

Consulte la Información de seguridad importante en todo este documento, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).



Para obtener más información, llame al 1-888-209-9326 o visite XPOVIO.com.

© 2023 Karyopharm Therapeutics Inc. Todos los derechos reservados. US-XPOV-03/20-00041 (08/23)

